BIO-VAL
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

Dans l' ordre de prélèvement des tubes



1 Tube citrate bleu

Activité anti-Xa
(< 6h) pour HBPM
(<2h) si patient sous HNF
D-Dimères (DDIM)
Fibrinogène
INR
TCA/TCK (< 6h)
TP

1 Tube rouge

Digoxine (6 à 8h après la prise) (< 8h)
Lithium (avant la prise) stable 48h

1 Tube jaune (Sérothèque comprise)

Beta H.C.G. (Date Dernières Règles)
Hépatite A Ac totaux
Hépatite A IgM
Sérologie CMV
Sérologie EBV
Sérologie Hépatite B
Sérologie Hépatite C
Sérologie Hépatite E IgM (< 8h)
Sérologie HIV
Sérologie Helicobacter Pylori
Sérologie de Lyme
Sérologie Rubéole
Sérologie Syphilis (BW)
Sérologie toxoplasmose

1 Tube jaune

Ac anti peptides citrullinés (CCP)
ACE
Acide urique
AFP
Albumine
AMH (< 6h)
ATG
ATPO
Bêta 2 microglobuline
Bilan hépatique
Bilan lipidique
Bilirubine
Calcium
CA 125
CA 15.3
CA 19.9
Chlore (Cl)
Cholestérol
Coefficient de saturation de la Transferrine
Cortisol (entre 6h et 10h, idéal 8h)
CPK
Créatinine + clairance calculée
CRP
C3 complément
C4 complément
Dépakine (avant la prise)
Electrophorèse des protéines
Estradiol (Date Dernières Règles)
Facteur rhumatoïde
Ferritine
Fer sérique
FSH (Date Dernières Règles)
GGT
Haptoglobine
HCG (Date Dernières Règles)
HDL Cholestérol
IgA
IgE totales
IgG
IgM
Immunofixation
Insuline (< 6h)
Ionogramme (< 6h)
LDH
LDL Cholestérol
LH (Date Dernières Règles)
Lipase
Magnésium
NT-proBNP
Orosomucoide
PAL
Phosphore (< 8h)
Potassium (K) (< 6h)
Préalbumine
Procalcitonine (PCT)
Progestérone (Date Dernières Règles)
Prolactine (entre 8 et 12h après 20 min de repos)
Protéines totales
PSA Totale
PSA Libre (< 4h)
Réserve alcaline/bicarbonate (< 6h)
Sodium (Na)
Testostérone
TGO/ASAT
TGP/ALAT
Transferrine
Triglycérides
Troponine (< 8h)
TSH (Médicament pour la thyroïde ?)
T3 Libre (Médicament pour la thyroïde ?)
T4 Libre (Médicament pour la thyroïde ?)
Urée
Vitamine B12
Vitamine B9 (folate)
Vitamine D

1 Tube violet EDTA

NFS
Plaquettes
Réticulocytes
VS
Hémoglobine glyquée (HbA1c)

1 Tube violet EDTA

Tacrolimus
Ciclosporine

Tube violet EDTA

Groupe sanguin
RAI

1 Tube violet EDTA

Paludisme
PTH
CTX (cross laps) (< 8h)

1 Tube gris

Alcoolémie (< 6h)
Glycémie
Glycémie post-prandiale (1h30 après le début du repas)

1 Tube Rose spécifique à demander au laboratoire

ACTH (< 4h) (entre 7h et 10h)

Renseigner le nom du médicament, la posologie, la date et l'heure de la dernière prise

Des horaires spécifiques à respecter en fonction de l'heure d'injection. Se rapprocher absolument du laboratoire !

Urgence à rapporter rapidement au laboratoire

Horaires de prélèvement spécifiques à respecter, (…) : Modalités de prélèvement (…) : Renseignements à fournir

A jeun depuis 12 heures

A rapporter rapidement au laboratoire

Photocopie pièce d'identité

Catalogue des examens en ligne sur notre site internet : **www.bio-val.fr**