NOUVELLES ANALYSES
RÉALISÉES SUR NOTRE PLATEAU TECHNIQUE



DE NOUVEAUX AUTOMATES
PLUS DE COMPÉTENCES & DE PERFORMANCE

Cher(s) confrère(s), chère(s) consœur(s),

Nous avons le plaisir de vous informer que notre laboratoire de biologie médicale a récemment mis en place de nouvelles analyses afin de mieux répondre à vos besoins et à ceux de vos patients en acquérant de **nouveaux automates ROCHE.**

Voici un bref descriptif des nouvelles analyses disponibles :

- **ACTH (Adrenocorticotropic Hormone)** : L'ACTH est une hormone produite par l'antéhypophyse qui stimule notamment la production de cortisol par les glandes surrénales. Cette analyse est essentielle pour le diagnostic et le suivi des troubles de la fonction surrénalienne, tels que la maladie d'Addison et le syndrome de Cushing.

- **SDHEA (Sulfate de Déhydroépiandrostérone)** : La SDHEA est une hormone stéroïdienne produite par les glandes surrénales. Son dosage permet d'évaluer la fonction surrénalienne et est utile dans le diagnostic des troubles androgéniques (hirsutisme, virilisme,...), ainsi que dans le suivi de certaines pathologies de la surrénale.

- **Crosslaps** : Les Crosslaps (ou Télopeptide C-Terminal) sont des marqueurs spécifiques de la dégradation du collagène osseux. Leur dosage est utilisé pour évaluer le turn-over osseux et est particulièrement pertinent dans le suivi thérapeutique de l'ostéoporose.

- **Thyroglobuline** : La thyroglobuline est une protéine produite par la glande thyroïde et est un marqueur spécifique des cellules thyroïdiennes. Son dosage est essentiel dans le suivi des patients ayant été traités pour un cancer de la thyroïde, permettant de détecter une éventuelle récidive. Son dosage doit être systématiquement associé au dosage des Anticorps anti-thyroglobuline qui interfèrent avec les techniques utilisées en abaissant le taux de thyroglobuline.



- **Modification du dosage des Anticorps anti-Hépatite A** : les IgG seuls ne seront plus réalisées. On réalise dorénavant soit les IgM seuls (suspicion d'hépatite A aiguë), soit les Ig totaux (IgG +IgM).

- **Modification du dosage de la Troponine** : passage de la Troponine I à la Troponine T hypersensible.

Ces 2 troponines sont aussi performantes l'une comme l'autre.
Cependant, la Troponine T peut être augmentée en cas de maladies musculaires sévères (myosite, rhabdomyolyse, exercice physique intense), d'Insuffisance Rénale chronique (plus le DFG diminue plus la TnT augmente) et le taux augmente avec l'âge (le seuil de positivité est fixé à 50pg/mL chez les patients de plus de 70 ans au lieu de 14pg/mL chez les patients de moins de 70 ans).

Ces nouvelles analyses sont désormais disponibles et peuvent être prescrites via notre laboratoire. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire ou pour toute question concernant ces nouvelles prestations.

Nous restons à votre disposition pour toute demande et vous remercions de votre confiance.
Cordialement,

Les Biologistes Bio-Val